Update Modul Pädiatrische Neurophysiologie EEG-Normvarianten und Anfallsmuster

Tilman Polster

Stuttgart, 10.10.2024

Disclosures

Honorare / Unterstützung von Desitin, Eisai, Jazz, Takeda, UCB

Zum Aufwärmen

Positive Spikes

14 & 6 Hz positive bursts

- arkadenartig (kamm-ähnlich (ctenoids))
- Oberflächen-positiv
- niedrig-amplitudig (meist $<75 \mu\text{V}$)
- Dauer 0.5–2 s

- Frequenz 14 Hz (13–17 Hz) oder 6 Hz (5–7 Hz)

- meist posterior temporal

- meist in Müdigkeit / leichtem Schlaf

- ab 5 Jahren in 10% / bei Jugendlichen 20%

- Tipp: Positivität in der Referenz

14 & 6 Hz positive bursts

DOI: 10.1002/epd2.20040

SEMINAR IN EPILEPTOLOGYEpileptic
Disorders

Nachlesen?

Normal variants and artifacts: Importance in EEG interpretation

Ushtar Amin¹ | Fábio A. Nascimento² | Ioannis Karakis³ | Donald Schomer⁴ |
Selim R. Benbadis¹

Nachschlagen!

Temporale Spikes?

Temporale Spikes?

Temporale Spikes?

Temporale Spikes?

- Torbogen-ähnlich
- Oberflächen-negativ
- Spitz
- (60) bis 200 μ V
- Dauer 0.5–3 s

- Frequenz 6-11Hz

- Temporal, häufiger links

- meist in Müdigkeit / leichtem Schlaf

- häufiger bei Erwachsenen

- Tipp: Spike-Kriterien erfüllt?

Optimized set of criteria for defining interictal epileptiform EEG discharges

Mustafa Aykut Kural^a, Hatice Tankisi^a, Lene Duez^a, Vibeke Sejer Hansen^a, Aparna Udipi^b, Richard Wennberg^c, Stefan Rampp^d, Pål G. Larsson^e, Reinhard Schulz^f, Sándor Beniczky^{a,g,h,*}

- (1) Bi/ Triphasische Welle mit Spitze
- (2) Potenzialdauer anders als Hintergrundaktivität
- (3) Asymmetrie: steiler Anstieg mit langsamem Abfall (oder umgekehrt)
- (4) Langsame Nachschwankung folgt dem steilen Transienten
- (5) Hintergrundaktivität ist unterbrochen
- (6) Potenzialverteilung hat plausibles Feld für Quelle im Gehirn
  - plausibles Feld (negative Pol anterior)
  - kein plausibles Feld

Suchen

NOW LIVE: Sándor Beniczky, When is a spike a spike and who finds it?

Danish Epilepsy Centre
FILADELFIA

When is a spike a spike and who finds it?

Operational criteria for Epileptiform EEG Discharges & the role of algorithms in reading EEG - in the near future

Sándor Beniczky

sbz@filadelfia.dk

@SBeniczky

2:06 / 1:01:05 Use the YouTube Live Chat box.

Wicket Spikes keine epileptiformen Muster

- Torbogen-ähnlich
- Oberflächen-negativ
- Spitz
- (60) bis 200 μ V
- Dauer 0.5–3 s

- Frequenz 6-11Hz

- Temporal, häufiger links

- meist in Müdigkeit / leichtem Schlaf

- häufiger bei Erwachsenen

- Tipp: Spike-Kriterien (ILAE) nicht erfüllt

Posteriore Rhythmen

Rhythm. Delta posterior

5J 6M w SPR

15

Posteriore Rhythmen

asynchron

FIG. 34. Posterior rhythmic waves. Four years. Eyes closed. Rhythmic 3- to 4-Hz posterior waves may shift from side to side, as in this example. Their sharply contoured appearance in this segment does not necessarily indicate hidden spike waves and simply may be the result of a combination of wave forms. Calibration signal 1 second, 150 μ V.

synchron

FIG. 36. Eye closure elicits posterior rhythmic waves. Six years. Eye closure and then eye opening (*) elicit and abolish such normal potentials. Calibration signal 1 second, 70 μ V.

7J w

Blockade bei Augenschluss

Posteriore Theta/Delta / Slow fused transients

FIG. 50. Prominent theta and delta. Eight years. Eyes closed. There is a greater quantity of theta and delta in this figure as compared to some others in this age group. Note the sensitivities when comparing samples. Calibration signal 1 second, 100 μ V.

Blume und Kaibara, 1999

Posteriore Rhythmen

posteriore rhythmische Wellen (slow posterior rhythm)
(rhythmische Variante der POSWY)

- sinusförmig, niedrig - mittelhoch
- Amplituden 50-100 μV bei 90%, >100 μV bei 10%
- 2,5 - 4,5 Hz
- in kurzen Folgen oder längeren Abläufen; 25% $\geq$ 3 sec
- seltener in bursts: mittlere/hohe Amplituden
- bei 25% der normalen Kinder

Maximum 5. – 7. Lebensjahr

2-10% der normalen posterioren Aktivität, bei 10% häufiger

Petersen & Eeg-Oloffson, 1971

Posteriore Rhythmen

Posteriore Rhythmen

Posteriore Rhythmen

Epileptiforme Muster?

Epileptiforme Muster: Wo?

Schon wieder posterior?

Schon wieder posterior?

Fokale langsame Wellen

Fokale langsame Wellen

Glossokinetisches Artefakt

Delta-Wellen?

Delta-Wellen + Artefakte

Delta-Wellen + Artefakte

Anfallsmuster links zentral

Delta-Wellen?

EEG of Partial Seizures

Amit Verma* and Rodney Radtke†

The EEG in Selected Generalized Seizures

Richard A. Hrachovy*† and James D. Frost Jr.*†

The EEG in Nonepileptic Seizures

Selim R. Benbadis

Fokale Anfallsmuster

- Abbruch interiktaler epileptiformer Muster
- Abflachung: schnelle, niedrigamplitudige Aktivität
- rhythmische Aktivität: Alpha-, Theta- oder Delta

Verma & Radtke; EEG of partial seizures; J Clin Neurophys, 2006

Abbruch interiktale Aktivität

Fokale Anfallsmuster

“There is a change, and a change in the change”

- Variabel
- Beginn:
abgrenzbare Änderung zur bestehenden Hintergrundaktivität
- Verlauf:
Evolution in Frequenz / Amplitude / Feld
- Ende:
abgrenzbares Ende des rhythmischen Musters,
das wieder in die Hintergrundaktivität übergeht.
- Entscheidendes Merkmal: Evolution

Verma & Radtke; EEG of partial seizures; J Clin Neurophys, 2006)

“There is a change, and a change in the change”

abgrenzbare Änderung zur bestehenden Hintergrundaktivität

“There is a change, and a change in the change”

Evolution in Frequenz / Amplitude / Feld

“There is a change, and a change in the change”

“There is a change, and a change in the change”

Ende abgrenzbar: Übergang in Hintergrundaktivität

Bessere Übersicht über Dynamik durch andere Zeitachse

Bessere Übersicht über Dynamik durch andere Zeitachse

Theta-Aktivität

Anfälle mit

- Übelkeit
- Sprachstörung

Artefakt

Anfälle mit

- Übelkeit
- Sprachstörung

Anfallsmuster

Posteriores rhythmisches Theta

Theta zentral

Cigánek Rhythmus (midline central theta)

- Theta (4-7 Hz)
- Rhythmische, sinusoidale, bogenförmige Wellen
- an- und abschwelend
- Irregulär oder triangulär

- Mittellinie (Maximum Cz)

- Dauer $\geq 3s$
- Amplitude $> 50\mu V$

- wach (Konzentration) und Müdigkeit

Cigánék Rhythmus

Und dies?

Klonischer Anfall Zentralregion

schon wieder temporal

Rhythmisches temporales Theta

rhythmic midtemporal Theta / psychomotorische Variante

- Form variabel (bogenförmig)
- Rhythmisch
- Keine Evolution
- Oberflächen-negativ
- Mittlere Amplituden
- 4-7 Hz
- Temporal (kann sich ausbreiten)

- Sekunden bis Minuten

- Müdigkeit
- Jugendliche / Erwachsene

Petersen & Eeg-Oloffson, 1971

Anfallsmuster temp anterior

Anfallsmuster Hippocampus li

Anfallsmuster linke Hemisphäre

Anfallsmuster links temporal

Fokaler Anfall

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurde das Videomaterial an dieser Stelle entfernt.

Im Alltag

- Kriterien für Spikes / Sharp Waves und Anfallsmuster prüfen
- Kontext? Alter / Vigilanz
- Varianten benennen / nachschlagen
- Bei Anfällen immer die Patienten / Eltern fragen
- EEG-Muster und Klinik müssen zusammenpassen
- Nicht an einer Seite “festbeißen”

Artefakte, rhythmisch?

Artefakte, rhythmisch!

Epilepsie-Zentrum Bethel: Krankenhaus Mara

3-Tesla-
MRT

EP1: Behinderte Menschen
mit Epilepsie, 27 Betten

EP2: Diagnostikstation,
30 Betten

EP3: Therapiestation, 30 Betten

Junge Erwachsene
18 Betten

Kinderepileptologie „Kidron“
30 Betten

Reha-Klinik
35 Plätze

Wenn Sie das und vieles mehr intensiver diskutieren möchten

✓ *im Alltag*

✓ *mit Gehalt*

✓ *in einem supernetten Team*

melden Sie sich gerne!

tilman.polster@mara.de