Disclosures

Honorare für Schulungen zu
Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment (SINDA)

Autorenhonorar Buch
Buch SINDA bei Kohlhammer

Herzlich Willkommen

zu

Entwicklungsneurologische Untersuchungsverfahren
Nutzen – und Herausforderungen

9. Oktober 2024 *Heike Philippi*

Agenda

1. Was brauchen wir (*Nutzen*)?
2. Warum ist die (entwicklungs)neurologische Untersuchung im Kindesalter so anspruchsvoll (*Herausforderung*)?
3. Wie könnte es gehen (*Beispiel SINDA*)?

Was brauchen wir?

Ein entwicklungsneurologisches Untersuchungsverfahren, dass

- ✓ Bild der Funktionsfähigkeit des Kindes gibt:
was ist typisch /atypische und was ist nur vorübergehend /bleibend - Prognose
- ✓ Hinweise für weitere Diagnostik gibt, um z.B. die Ätiologie/Krankheitsbild zu klären
- ✓ Standard, Eltern zu beraten und Kollegium zu informieren
- ✓ uns die Basis gibt, für rechtzeitige Förderung und Therapie & von unnötigen Maßnahmen abzuraten (Elternentlastung)
- ✓ ermöglicht, den jetzigen Status präzise für Nachuntersuchungen festhalten
- ✓ Daten für Qualitätssicherung und ggf. wissenschaftliche Studien erlaubt

Warum ist das so anspruchsvoll?

- ✓ Komplexe und rasche Entwicklungsprozesse des Gehirn

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

Warum ist das so anspruchsvoll?

- ✓ Komplexe und rasche Entwicklungsprozesse des Gehirn
- ✓ Intra- und interindividuelle Variation der Entwicklung
- ✓ individuelle genetische Ausstattung
- ✓ Dysfunktionen stellen sich altersabhängig unterschiedlich dar
- ✓ es braucht altersspezifische Beurteilungsmerkmale ($\neq$ one size fits all)

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

Motorische Entwicklungsverläufe nach Michaelis

Warum ist das so anspruchsvoll?

- ✓ Komplexe und rasche Entwicklungsprozesse des Gehirn
- ✓ Intra- und interindividuelle Variation der Entwicklung
- ✓ individuelle genetische Ausstattung
- ✓ Dysfunktionen stellen sich altersabhängig unterschiedlich dar
- ✓ es braucht altersspezifische Beurteilungsmerkmale ($\neq$ one size fits all)
- ✓ Intra- und interindividuell unterschiedliche externe Einflussfaktoren
- ✓ Intra- und interindividuelle Reaktion auf schädigende Ereignisse (Neuroplastizität – Resilienz)

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

49. Jahrestagung der
**GESELLSCHAFT FÜR
NEUROPÄDIATRIE**
und 20. Fortbildungsakademie

Schädigungen/Einflussfaktoren:

Ursachen	Zeitpunkt
• Genetisch/Stoffwechsel bedingt	ab Konzeption
• Hirnmalformationen, z. B. Lissencephalie oder Schizencephalie	pränatal: 1. Schwangerschaftshälfte
• Infektionen, z. B. CMV, Chorioamnionitis, neonatale Sepsis, Meningitis	pränatal, perinatal, neonatal
• Drogen/Toxine, z. B.	
– Alkohol	pränatal
– Antikonvulsiva (v. a. VPA)	pränatal
– Quecksilber	pränatal und postnatal (Stillen)
– Corticosteroide	postnatal bei Frühgeborenen
– Bilirubin	neonatal bei Früh- und Termingeborenen
• Intrauterine Wachstumsretardierung ^a	pränatal: 2. Trimester (früh beginnend) und 3. Trimester (spät beginnend)
• Frühgeburtlichkeit ^b	zwischen 22.–24. und 37. Woche pm
• Hypoxie-Ischämie	ab Schwangerschaftsmitte: pränatal, perinatal, neonatal bei Früh- und Termingeborenen

- **Zeitpunkt des Einwirkens**
- **Intensität des Risikoereignisses**
- **Dauer der Risikoereignisses**
- **Kombination mit weiteren Risikoereignissen**

“Die Expertin”:

Oh weh, wie soll dann eine
entwicklungsneurologische
Untersuchung je klappen??

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

Wie eine entwicklungsneurologische
Untersuchung gehen könnte

am Beispiel von

**SINDA: Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment**
*An instrument for early detection of
neurodevelopmental disorders*

Mijna Hadders-Algra, Uta Tacke,
Joachim Pietz, and Heike Philippi

Mac Keith Press Practical Guides

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

49. Jahrestagung der

**GESELLSCHAFT FÜR
NEUROPÄDIATRIE**

und 20. Fortbildungsakademie

Darum SINDA !

- ✓ Standardisiert – Cut-offs
- ✓ Vorhersage für Funktionsfähigkeit des Gehirns und Feststellung des Entwicklungsstands
- ✓ Neuro-, Entwicklungs- und sozioemotionale Skala
- ✓ einfaches Material ohne Testkosten
- ✓ Manual mit Videos und Fotos – kein Kurs nötig
- ✓ in kurzer Zeit durchführbar
- ✓ leicht erlernbar

Neurologische Untersuchungsverfahren bisher

- ✓ Diagnostik nach Vojta – zu viele Kinder fälschlicherweise mit V.a. CP
- ✓ Untersuchung nach Michaelis – eminenz-based – Motorik lastig
- ✓ Hammersmith-Skala, TIMP – motorisches Outcome/CP –TIMP teuer (~500\$)
- ✓ General Movements GMS – für HochrisikoFG/NG –anspruchsvoll –bis 4 Mo
- ✓ Touwen Infant Neurological Assessment – nur mit 18 Mo evaluiert –aufwendig
- ✓ Dubowitz – bis 4 Monate – zu viele falsch auffällige Kinder
- ✓ ...

Entwicklungstests bisher

- ✓ Griffith-Skalen
- ✓ Bayley II-III
- ✓ Denver

*nur Entwicklungsbeurteilung –
also keine Rückschlüsse über neurologische Funktionsfähigkeit des Gehirns möglich*

keine gute neurologische Prädiktion möglich

wenige Items im Säuglingsalter – also geringe Verlässlichkeit/Vorhersage

Bayley und Griffith nur mit teurem Testkoffer/-Bögen möglich

Wie funktioniert SINDA?

- Alter 2 -12 Monate ($\pm$ 2 Wochen)
- 3 Skalen
 - Neuroskala (28 Items)
 - Entwicklungsskala (113, 15 Items pro Altersgruppe)
 - kognitiv
 - kommunikativ
 - feinmotorisch
 - grobmotorisch
 - sozioemotionale Skala (3-5 Items pro Altersgruppe & 3 Items:
 - Emotionalität
 - Selbstregulation
 - Reaktivität)

- 3 Skalen

Neuroskala

8-10 min

Entwicklungsskala

5-7 min (bis 4 Mo)

7-10 min (5-9 Mo)

10-15 min (10-12 Mo)

sozioemotionale Skala

keine Extrazeit

Beobachtung während der

Untersuchung

Summe

12-25 min*

*inklusive Dokumentation

Neuroskala

Identisches Formular für den gesamten Altersbereich

Ausschluss altersabhängiger Items

1 = typisch
0 = atypisch

≤ 21 Punkte = Risiko

(gesamt 28 Punkte)

SINDA-Formular: Neurologische Skala

Verhaltenszustand wach, aufmerksam schläfrig, müde
 weinlich, unleidlich schreit sub-akut krank

Paroxysmale Ereignisse keine fraglich sicher

Kopf cm Makrozephalie Mikrozephalie
 Plagiozephalie auffällige Fontanelle auffällige Schädelnähte

Sonstiges Körperliche Befunde schwere Schminderung Dysmorphien
 schwere Hörminderung atypische Phonation

Name:
 Geb: ♂ / ♀
 Kom. Alter:
 Datum:
 Untersucher:
 Klinik:

Zusätzliche klinische Befunde:

Pos *	BT†	Item	typisch (1)	atypisch (0)	betr.	P
A1 Spontanmotorik (regional)						
1	A, B	Kopf & Hals & Rumpf	variationsreich & symmetrisch	stereotyp, opistoton, asymmetrisch	R, L	
2	A, B	Arme	variationsreich & symmetrisch	stereotyp, asymmetrisch	R, L	
3	A, B	Hände	variationsreich & symmetrisch	stereotyp, asymmetrisch	R, L	
4	A, B	Beine	variationsreich & symmetrisch	stereotyp, asymmetrisch	R, L	
5	A, B	Füße	variationsreich & symmetrisch	stereotyp, asymmetrisch	R, L	
6	R, B	ATNR Muster	nicht, gelegentlich vorhanden	häufig, kontralateral, asymmetrisch		
A2 Spontanmotorik (global)						
7	A, B	Qualität	variationsreich & symmetrisch & flüssig & isolierte Finger- & Zehenbewegungen	stereotyp, zitterig, steif, ruckartig, ausfahrend, schwach, keine isolierten Finger-, Zehenbewegungen, asymmetrisch	R, L	
8	A, B	Quantität	mittlere Anzahl an Bewegungsaktivität & wechselnd über die Zeit	vorwiegend hypokinätisch, vorwiegend hyperkinätisch		
B Hirnnerven						
9	A, B	Gesichtsausdruck	variationsreich & symmetrisch	ausdruckslos, asymmetrisch	R, L	
10	A, B	Mundmotorik	Mund geschlossen & Zunge im Mund & kein ausgeprägter Speichelfluss	Mund meist geöffnet, Zunge stereotyp vorgestreckt, Faszikulationen, ausgeprägter Speichelfluss		
11	R, S, T	Glabellareflex	mittlere Schwelle & mittlere Intensität & symmetrisch	niedrige, hohe Schwelle, niedrige, hohe Intensität, asymmetrisch		
12	R, S, T	Augenstellung & Augenbewegungen	fixiert & parallele Augenstellung & konjugierte Augenbewegungen	fixiert nicht, vorherrschender Strabismus, unkonjugierte, eingeschleifte Augenbewegungen, Sonnenuntergangsphänomene, Nystagmus	R, L	
13	R, S, T	Optischer Blinkreflex	Blinken & symmetrisch	keine, fragliche, verzögerte Reaktion, asymmetrisch	R, L	
14	R, S, T	Pupillenreaktion	direkt & indirekt: prompt & symmetrisch	keine, langsame, tonische Reaktion, asymmetrisch	R, L	
15	R, S, T	Akustischer Blinkreflex	Blinken, Reaktion im Gesichtsausdruck	fehlt, zweifelt		
C Motorische Reaktionen bei posturaler Stimulation						
16	R, T	Traktion zum Sitzen	aktiviert Nacken- & Schulter- & Armmuskeln & symmetrisch & adäquate Flexion der Hüftgelenke	Kopf hängt, Kopferbreckung, keine, geringe Muskelaktivierung, inadäquate Hüftflexion, asymmetrisch	R, L	
17	B, B	Kopf in Bauchlage	hebt Kopf an	hebt Kopf nicht an, Kopf in stereotyper Überbreckung		
18	BS, T	Bauchschwebelage	hebt Kopf auf, über die Rumpfebene	Kopf hängt, Rumpf hängt, stereotyp, Opisthotonus		
19	AX, T	Axilläre Hängelage	Kopf aufrecht & angemessener Widerstand & variationsreiche Beinbewegungen	keine, geringe Kopfkontrolle, Durchschlüpfphänomene, Beinbewegungen stereotyp, asymmetrisch	R, L	
20	AX, T	Axilläre Hängelage, Füße berühren die Unterlage	variationsreiche Fußbewegungen & Fußpositionen & symmetrisch	stereotype Fußhaltungen, asymmetrisch	R, L	
D Muskeltonus						
21	R, R, T	Tonus von Hals & Rumpf	mittlere Widerstand gegen passive Bewegungen	konstante Hypotonie, konstante Hypertonie, plötzlicher Tonuswechsel		
22	R, S, T	Widerstand gegen passive Bewegungen, Armtraktion	mittlere Widerstand gegen passive Bewegungen & milde Ellenbogenflexion & symmetrisch	konstante Hypotonie, konstante Hypertonie, plötzlicher Tonuswechsel, asymmetrisch	R, L	
23	R, S, T	Widerstand gegen passive Bewegungen, Beintraktion	mittlere Widerstand gegen passive Bewegungen & milde Knieflexion & symmetrisch	konstante Hypotonie, konstante Hypertonie, plötzlicher Tonuswechsel, asymmetrisch	R, L	
24	R, S, T	Füße: Widerstand gegen passive Bewegungen	mittlere Widerstand gegen passive Bewegungen & symmetrisch	konstante Hypotonie, konstante Hypertonie, plötzlicher Tonuswechsel, Kloni, Catch Phänomene passiv, asymmetrisch	R, L	
E Reflexe und Reaktionen						
25	R, S, T	Obere Extremitäten: BSR	symmetrische positive Reflexantwort	Areflexie, asymmetrisch	R, L	
26	R, S, T	Untere Extremitäten: PSR & Fußklonus	symmetrische positive Reflexantwort	Areflexie, tonische Reaktionen, Kloni, asymmetrisch	R, L	
27	R, S, T	Fußsohlenverstellbarkeit	zieht Beine zurück & variationsreiche Bewegungen & symmetrisch	keine Reaktion, stereotype Zehenbewegungen, asymmetrisch	R, L	
28	R, S, T	Fußsohlenreaktion	variationsreiche Dorsalflexion 1er Zehe & Zahenspreizung & symmetrisch	stereotype Dorsalflexion, stereotype Plantarflexion, (fast) keine Reaktion, asymmetrisch	R, L	

* Pos: Position; A: Alle; AX: Axilläre Hängelage; B: Bauchlage; BS: Bauchschwebelage; R: Rückenlage; RS: Rückenschwebelage; S: (gehaltene) Sitz;
 † B: Beobachtungsbefund; T: Testbefund
 betr.: betroffene Seite

Hadders-Algra/Tacke Pietz/Philippi SINDA Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment © 2017 W. Kulkarni, New York, USA

Name: Vorname: Geb.Datum: U.Datum: FG korr. Alter (Mon): Untersucher: Klinik:

Verhaltenszustand: wach, aufmerksam schläfrig, müde weinerlich, unleidlich schreit, nicht untersuchbar

♂ / ♀

Zusätzliche klinische Befunde:

Entwicklungsskala

1 Formular 2-6 - Monate

1 Formular 7-12 Monate

1 M 15 - 2 M - 2 M 14			2 M 15 - 3 M - 3 M 14			3 M 15 - 4 M - 4 M 14			4 M 15 - 5 M - 5 M 14			5 M 15 - 6 M - 6 M 14		
1	Lächelt reaktiv auf das Lächeln der Mutter oder Untersucherin	R Si	16	Schaut zwischen Mutter und Untersucherin hin und her	R Si	16	Schaut zwischen Mutter und Untersucherin hin und her	R Si	27	Interesse an der Umgebung & orientiert sich im Raum	A	49	Betrachtet aufmerksam und anhaltend die Mimik der Untersucherin	R Si
2	Nimmt Kontakt auf, studiert Gesicht und Mimik	R Si	4	Bildet ≥ 2 verschiedene Laute, z.B. gaah, ooh	A	27	Interesse an der Umgebung & orientiert sich im Raum	A	28	Richtet wechselnd Aufmerksamkeit auf Objekte und Personen	R Si	50	Benutzt eigene Mimik zur Kommunikation	R Si
3	Reagiert auf gurrende Laute der Mutter oder Untersucherin	R Si	5	Lautiert dialogartig in Reaktion auf Ansprache	R Si	28	Richtet wechselnd Aufmerksamkeit auf Objekte und Personen	R Si	31	Zeigt Gefühle durch Lautieren, lacht stimmhaft	A	39	Bildet ≥ 3 Konsonant-Vokal-Verbindungen	A
4	Bildet ≥ 2 verschiedene Laute, z.B. gaah, ooh	A	17	Expressives Lautieren: zeigt Gefühle durch Lautieren	A	29	Bildet ≥ 3 verschiedene Laute	A	39	Bildet ≥ 3 Konsonant-Vokal-Verbindungen	A	51	Macht durch Lautieren auf sich aufmerksam	A
5	Lautiert dialogartig in Reaktion auf Ansprache	R Si	18	Blinzeln bei optischer Annäherung der Hand	R Si	30	Bildet mindestens einen Lippenlaut und eine Konsonant-Vokal-Verbindung	A	40	Lokalisiert Stimme & wendet Augen zur Stimme	A	52	Bildet Silbenreihen mit Sprachmelodie	A
6	Reagiert auf Geräusche	A	19	Wendet Augen zum Geräuschobjekt	A	31	Zeigt Gefühle durch Lautieren, lacht stimmhaft	A	32	Schaut auf 'verschwindenes' Objekt	Si	53	Wendet Augen oder Kopf zu leisem Geräusch, z.B. Papierrascheln	A
7	Fixiert Objekt in 30 cm Entfernung für kurze Zeit	R Si	20	Schaut langsam von einem Geräuschobjekt zum anderen	R Si	20	Schaut langsam von einem Geräuschobjekt zum anderen	R Si	41	Schaut ≥ 3 sec auf 'verschwindenes' Objekt	Si	41	Schaut ≥ 3 sec auf 'verschwindenes' Objekt	Si
8	Folgt einem Objekt mit Kopf oder Augen horizontal	R Si	21	Folgt einem Objekt mit Kopf oder Augen horizontal und vertikal	R Si	32	Schaut auf 'verschwindenes' Objekt	Si	42	Betrachtet in seiner Hand gehaltenes Objekt	R Si	54	Schaut fallendem Objekt nach, das Krach macht	Si
9	Folgt einem Objekt mit Kopf oder Augen vertikal	R Si	11	Schaut eigene Hand an	R Si	12	Führt Arm in Richtung eines attraktiven Objekts	R Si	43	Greift über die Mittellinie nach einem Objekt	R Si	55	Untersucht Spielzeug mit Interesse an Einzelheiten	R Si
10	Bewegt Hand zum Mund	R Si	22	Bewegt Arm wenn ein Objekt im Blickfeld erscheint	R Si	33	Ergreift ein im Blickfeld gehaltenes Objekt mit der Hand	R Si	44	Übergibt Objekt von Hand zu Hand	R Si	44	Übergibt Objekt von Hand zu Hand	R Si
11	Schaut eigene Hand an	R Si	12	Bewegt Arm in Richtung eines attraktiven Objekts	R Si	34	Führt Objekt zum Mund & berührt es mit Mund & Hand	R Si	45	Hält ein Objekt fest & berührt gezielt ein zweites Objekt	R Si	45	Hält ein Objekt fest & berührt gezielt ein zweites Objekt	R Si
12	Bewegt Arm in Richtung eines attraktiven Objekts	R Si	23	Hände werden zur Mittellinie gebracht & Hände berühren sich	R Si	35	Erkundet Objekt mit beiden Händen	R Si	46	Spielt mit Schnur	Si	56	Hält 2 selbst ergriffene Objekte kurz fest	R Si
13	Im gehaltenen Sitz wird der Kopf für ≥ 3 sec gehalten	Si	24	Im gehaltenen Sitzen wird der Kopf für ≥ 5 sec gehalten	Si	36	Im gehaltenen Sitzen wird der Kopf ≥ 10 sec gehalten & nur kurzes Wackeln	Si	37	Hand-Knie-Kontakt	R	57	Spielt mit Fuß (Hand-Fuß-Kontakt)	R
14	Beine sind wechselnd auf der Unterlage & bds ≥ 3 sec abgehoben	R	25	Beine werden von der Unterlage abgehoben mit Fuß-Fuß-Kontakt ≥ 3 sec	R	37	Hand-Knie-Kontakt	R	47	Stützt sich auf beide Unterarme & greift nach Objekt	B	58	Schaukelnde und schlingelnde Rumpfbewegungen	B
15	Kopfhoben für ≥ 3 sec	B	26	Kopfhoben > 45° für ≥ 3 sec	B	38	Kopfhoben > 45° mit Abstützen auf Unterarmen ≥ 5 sec	B	48	Im gehaltenen Sitzen stabile Kopfkontrolle	Si	59	Ein- oder beidseitiger Handstütz	B
Σ			Σ			Σ			Σ			Σ		

● Interaktion 😊 😞

Emotionalität 😊 😞

Selbstregulation 😊 😞

Reaktiv Lage 😊 😞

Reaktiv Visuell 😊 😞

Reaktiv Akustisch 😊 😞

Name: Vorname: Geb.Datum: U.Datum: FG korr. Alter (Mon): Untersucher: Klinik:

Verhaltenszustand: wach, aufmerksam schläfrig, müde weinerlich, unleidlich schreit, nicht untersuchbar ♂ / ♀

Zusätzliche klinische Befunde:

	6 M 15 - 7 M - 7 M 14		7 M 15 - 8 M - 8 M 14		8 M 15 - 9 M - 9 M 14		9 M 15 - 10 M - 10 M 14		10 M 15 - 11 M - 11 M 14		11 M 15 - 12 M - 12 M 14			
60	Verfolgt mit Interesse Kuckuck-Spiel	Si	60	Verfolgt mit Interesse Kuckuck-Spiel	Si	73	Imitation von, z.B. Klatschen, Wedeln	Si	91	Imitiert backe-backe Kuchen oder Fingerspiele	Si	93	Reagiert auf die Frage: 'Wo ist..?' (Objekt, Person)	A
61	Zeigt referentiellen Blickkontakt	A	73	Imitation von, z.B. Klatschen, Wedeln	Si	74	Reagiert auf ein deutliches 'nein'	A	92	Variiert Mimik, Gestik in Reaktion auf vertraute und fremde Personen	A	82	Reagiert auf eigenen Namen	A
52	Bildet Silbenreihen mit Sprachmelodie	A	52	Bildet Silbenreihen mit Sprachmelodie	A	81	Bildet verbundene Drei-Silbenkette (canonic babbling)	A	82	Reagiert auf eigenen Namen	A	93	Reagiert auf die Frage: 'Wo ist..?' (Objekt, Person)	A
62	Verdeutlicht Wünsche mit Gesten, Mimik	A	62	Verdeutlicht Wünsche mit Gesten, Mimik	A	82	Reagiert auf eigenen Namen	A	93	Reagiert auf die Frage: 'Wo ist..?' (Objekt, Person)	A	94	Bildet ≥ 2 verschiedene verbundene Drei-Silbenketten	A
63	Imitiert Konsonant-Vokal-Verbindungen	A	63	Imitiert Konsonant-Vokal-Verbindungen	A	75	Erwartet mit Blick verschwundenes Objekt	Si	94	Bildet ≥ 2 verschiedene verbundene Drei-Silbenketten	A	83	Läutet Glöckchen absichtlich	Si
54	Schaut fallendem Objekt nach, das Krach macht	Si	74	Reagiert auf ein deutliches 'nein'	A	76	Schaut Bilder im Buch an	Si	83	Läutet Glöckchen absichtlich	Si	95	Schaut Bilder im Buch an & blättert um	Si
64	Beobachtet Kritzeln	Si	64	Beobachtet Kritzeln	Si	83	Läutet Glöckchen absichtlich	Si	95	Schaut Bilder im Buch an & blättert um	Si	96	Gemeinsame Exploration (joint attention)	A
65	Macht Geräusch durch Klopfen mit Objekt	A	75	Erwartet mit Blick verschwundenes Objekt	Si	67	Zieht Objekt absichtlich an Schnur heran	Si	96	Gemeinsame Exploration (joint attention)	A	100	Findet Spielzeug unter einem Becher	Si
66	Ergreift & hält zwei Objekte ≥ 3 sec fest	Si	76	Schaut Bilder im Buch an	Si	84	Entfernt ein Hindernis um an ein Objekt zu kommen	Si	85	Exploriert Objekt beim Betrachten mit den Fingerspitzen	A	97	Nutzt den Zeigefinger zum Berühren von Details eines Objekts	A
67	Zieht Objekt absichtlich an Schnur heran	Si	77	Dreht und wendet Objekt beim Betrachten	A	85	Exploriert Objekt beim Betrachten mit den Fingerspitzen	Si	86	Legt Objekt in einen Becher	Si	101	Hält zwei Objekte & ergreift ein drittes	Si
68	Benutzt Scherengriff (Daumen-Zeigefinger)	A	67	Zieht Objekt absichtlich an Schnur heran	Si	86	Legt Objekt in einen Becher	Si	97	Nutzt den Zeigefinger zum Berühren von Details eines Objekts	A	102	Benutzt Löffel zum Rühren in Becher, auf Teller (Imitation)	Si
69	Sitzt ohne Unterstützung ≥ 3 sec frei	Si	78	Versucht Objekt aus Becher zu räumen	Si	87	Sitzt anhaltend frei	Si	88	Sitzt frei & dreht Oberkörper	Si	103	Zieht an der richtigen Schnur Objekt heran	Si
70	Dreht sich von RL in BL	R	69	Sitzt ohne Unterstützung ≥ 3 sec frei	Si	88	Sitzt frei & dreht Oberkörper	Si	90	Fortbewegung auf allen Vieren, Hüpfen, Poporutschchen	B Si	90	Fortbewegung auf allen Vieren, Hüpfen, Poporutschchen	B Si
71	Greift aus BL nach Objekt mit Anheben des Armes	B	79	Kommt selbständig in Vierfüßlerstand	B Si	89	Kniestand & hält sich dabei an Möbeln fest	A	98	Setzt sich selbständig auf	R B	99	Zieht sich zum Stehen hoch	A
72	Kreisdrehen (Pivoting)	B	80	Fortbewegung, z.B. Robben, Rollen	B Si	90	Fortbewegung auf allen Vieren, Hüpfen, Poporutschchen	B Si	99	Zieht sich zum Stehen hoch	A	104	Macht einige Schritte seitwärts an Möbeln	St
	Σ			Σ			Σ			Σ			Σ	

Entwicklungsskala

1 Formular 2-6 - Monate

1 Formular 7-12 Monate

SINDA

Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment

Hadders-Algra/Tacke
Pietz/Philippi

Kognititon (hellgelb, 4-7 Items pro Altersgruppe)

Kommunikation (dunkelgelb, 3-4 Items pro Altersgruppe)

Feinmotorik (hellgrün, 2-5 Items pro Altersgruppe)

Grobmotorik (hellblau, 3-4 Items pro Altersgruppe)

= 15 Items pro Altersgruppe

Aussage *Entwicklungsskala*:

1 = typisch

0 = atypisch

Summe = 15 Pkt. Pro Altersklasse

Risiko ≤ 7 Pkt.

Möglichkeit: Zurückgehen bis zur Altersklasse,
in der mehr als 7 Pkt. erreicht werden

Aussage: Prognoseeinschätzung in Ergänzung zur Neuroskala
Beratung bezüglich Förder- und Therapieschwerpunkt

Sozioemotionale Skala

= 3-5 Items – es sollten mind. die Hälfte erreicht werden

= neutral oder freundliche Stimmung

= mittleres Aktivitätsniveau mit nur mäßiger Ko-Regulation

= Reaktivität auf Reiz mit mittlerer Intensität und
Auslöseschwelle

SINDA

Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment

Hadders-Algra/Tacke
Pietz/Philippi

1. Neuroskala - Spontanmotorik

infant of 4 months

spontaneous movements of arms
and hands (item 2 and 3)

typical performance:
varied and symmetric movements

1. Neuroskala – atypische Variation Hand und Arme

infant of 4 months

spontaneous movements of arms and hands
(items 2 and 3)

atypical performance:

reduced variation in arms and hands
arms mainly flexed and hands in fists

SINDA

Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment

Hadders-Algra/Tacke
Pietz/Philippi

DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY

ORIGINAL ARTICLE

2019

Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment developmental and socio-emotional scales: reliability and predictive value in an at-risk population

MIJNA HADDERS-ALGRA¹ | UTA TACKE² | JOACHIM PIETZ³ | ANDRÉ RUPP⁴ | HEIKE PHILIPPI⁵

DEVELOPMENTAL MEDICINE & CHILD NEUROLOGY

ORIGINAL ARTICLE

2020

Reliability and predictive validity of the Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment neurological scale

MIJNA HADDERS-ALGRA¹ | UTA TACKE² | JOACHIM PIETZ³ | ANDRÉ RUPP⁴ | HEIKE PHILIPPI⁵

Aussage Neuroskala:

1 = typisch

0 = atypisch

Summe = 28 Pkt.

Risiko ≤ 21 Pkt.

■ Falsch negativ

■ Falsch Positiv

Hadders-Algra M, et al. *Dev Med Child Neurol.* 2019; 61:654-660.
181 Kinder, 2-12 Monate, Risikokollektiv, Outcome ≥ 24 Monate
56 (31%) Kinder mit atypischem Outcome (CP, IM)

SINDA

Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment

Hadders-Algra/Tacke
Pietz/Philippi

SINDA Neuro Score	Outcome $\geq$ 24 Monate				Total
	typisch	atypisch			
		CP	atypisch, keine CP	alle atypisch	
> 21	117	0	6	6	123
$\leq$ 21	8	29	21	50	58
Total	125	29	27	56	181

CP Sensitivität 100%
 Spezifität 81%

Atypisch Sensitivität 89%
 Spezifität 94%

Received: 3 July 2023 | Accepted: 13 February 2024

DOI: 10.1111/dmcn.15901

ORIGINAL ARTICLE

Predictive value of the General Movements Assessment and Standardized Infant NeuroDevelopmental Assessment in infants at high risk of neurodevelopmental disorders

Mijna Hadders-Algra¹ | Uta Tacke² | Joachim Pietz³ | André Rupp⁴ | Heike Philippi⁵

Dev Med Child Neurol. 2024;00:1–8.

SINDA

Standardized Infant
NeuroDevelopmental Assessment

Hadders-Algra/Tacke
Pietz/Philippi

SINDA	Entwicklungsneurologischer Befund > 24 Monate		Summe
	typisch	atypisch	
> 21 Punkte	89	2	91
≤ 21 Punkte	10	14	24
Summe	99	16	115

GMA	Entwicklungsneurologischer Befund > 24 Monate		Summe
	typisch	atypisch	
normal	83	2	85
auffällig	16	14	30
Summe	99	16	115

SINDA

Sensitivität 0.88

Spezifizität 0.90

GMA

Sensitivität 0.88

Spezifizität 0.84

GMA = General Movement Analyse

Hadders-Algra M, et al. *Dev Med Child Neurol.* 2019; 61:654-660.

- Wiederholung von 24 video-basierte Untersuchungen
- Variation von Alter und neurologischem Handicap
- 3 verblindete Untersucher; Abstand der zwei Ratings 14-18 Monate

Intrarater Reliabilität

Summenscore	ICC	0.92-0.95	excellent agreement
Domainscore	ICC	0.80-0.93	good-excellent agreement
Einzelitem	Cohen's kappa	0.60-0.72	Substantial agreement

Interrater Reliabilität N=3

Summenscore	ICC	0.96	excellent agreement
Domainscore (4)	ICC	>0.75	good-excellent agreement
Einzelitem	Cohen's kappa	0.57-0.67	Substantial agreement

Entwicklungsskala für atypisch

Sensitivität	83%
Spezifität	96%

Sozioemotionale Skala für Verhaltensstörungen

Emotionalität

Sensitivität	32%
Spezifität	85%

Selbstregulation

Sensitivität	40%
Spezifität	98%

Aussage *Sozioemotionale Skala* :

*Interaktion, Emotionalität und Selbstregulation
atypisch*

*Beratung bezüglich förderlichem Umgang, u.a.
in Ambulanz für frühkindliche Regulationsstörung*

*Emotionalität und Selbstregulation
atypisch*

Risiko für emotionale und Verhaltensstörungen

Reaktivität atypisch

Temperamentsmerkmal ohne prognostische Bedeutung

Was tun mit dem SINDA – Ergebnis?

- ✓ bei typischen Ergebnisse beruhigen

- ✓ bei Neuroskala ≤ 21 Punkte
 - a) in Neurozentrum/-ambulanz schicken
 - b) Profil aller Skalen und Zusatzbefunde
(Verlauf, MRT, US, EEG, Labor..) betrachten
 - c) weitere Diagnostik veranlassen
 - d) Förderung und Therapie je nach Profil veranlassen
 - e) erneut untersuchen

Was tun mit dem SINDA – Ergebnis?

- ✓ **Achtung:**
von den Eltern entlocken, was und wie genau sie Ergebnisse wissen wollen
- ✓ **Eigene Erfahrung und Einschätzungssicherheit berücksichtigen**
- ✓ **bei vielen Kindern kann man früh die Entwicklung bereits im Säuglingsalter einschätzen – bei manchen geht das nicht.**

Basismodul II: Entwicklungsdiagnostik

Entwicklungsneurologische Untersuchung

49. Jahrestagung der

GESELLSCHAFT FÜR
NEUROPÄDIATRIE

und 20. Fortbildungsakademie

... Sie haben vielleicht ein bisschen Lust und Mut bei allem Respekt bekommen in die frühe entwicklungsneurologische Untersuchung einzusteigen...